

Sur le territoire de la commune de **Seyssinet-Pariset (Isère)**, accrochée au flanc est du **Vercors**, dans la banlieue grenobloise, un ensemble de sillons retient l'attention. Les plus bas d'entre eux sont bien connus [*Monjuvent, 1973*], ce sont ceux de la **Combe Vallier**, du **Désert de l'Écureuil** et du **Désert de Jean-Jacques Rousseau**.




Les **Déserts de Jean-Jacques Rousseau (1)** et de **l'Écureuil (2)**, vus de **Seyssinet-Pariset**.

Le **Désert de l'Écureuil**.



On considère classiquement ces sillons comme creusés lors des phases de décrue glaciaire, car l'étagement de leurs altitudes, de 350 à 460 m, les positionne très en dessous du niveau de la surface du glacier würmien (1150 mètres sur la cuvette grenobloise).

Mais au-dessus de cet ensemble, existe un ultime sillon rocheux, celui du **ruisseau du Bouteillard**, particulièrement remarquable, car large par endroits de 600 mètres environ, ce qui en fait le plus important de tous les sillons rocheux que nous avons rencontrés, même si ce n'est pas le plus spectaculaire, encombré qu'il est par les dépôts glaciaires.



Les sillons de Seyssinet-Pariset

Légende :

1 = Combe Vallier

2 = Désert de l'Écureuil

3 = Désert de Jean-Jacques Rousseau

4 = Le Bouteillard

Les sillons glaciaires de Seyssinet-Pariset

Écrit par Claude Beaudevin

Mercredi, 17 Novembre 2010 18:40 - Mis à jour Samedi, 21 Février 2015 16:48

L'origine de ce sillon du **Bouteillard** est étudiée à la page sur [le lac du Trièves](#).
